

Vadgesztenye

Aesculus hippocastanum

Drog: Hippocastani semen, Hippocastani cortex; vadgesztenye mag, vadgesztenye kéreg.


30 m-nél is magasabbra növő, lombhullató fa.

A szíromlevelek fehérek, a tövükön sárga, majd pirosló folttal.

Virágzata kúp alakú, 20-30 cm magas, felálló buga.

Levelei keresztben átellenesen állnak. A levéllemez 5-7 levélkéből tenyeresen összetett. A levélkék 20 cm-nél is hosszabbak, visszás tojásdad alakúak, felső harmadukban kiszélesedők.

Előfordulása:
Hazánkban díszfaként ültetik.



Hatása: A kapilláris erek tágulatát csökkenti, adsztringens (összehúzó hatású).

Gyulladáscsökkentő, antibakteriális, a kapilláris rezisztenciát növelő, vénatonizáló.

A kéreg az érfal ellenálló képességét növeli, az UV-sugarakat elnyelve bőrvédő

Alkalmazás:

A magból előállított készítmények elsősorban vér- értágulatok okozta ödémák, trombózis, visszeres lábszárfekély, vizenyők, hemorrhoidok megszüntetésére alkalmasak.

A kéregdrogot a népi gyógyászat kelések, bőrbántalmak ellen használta. Ma a belőle kivont eszkulint elsősorban külsőleg összehúzó szerként alkalmazzák, illetve több

Felhasználása:

A mag drog napi adagja: 30-150 mg eszcin, illetve annak megfelelő drogmennyiség.

Házi patikában KÜLSŐLEG alkalmazzuk.

Ellenjavallat:

Veseelégtelenség, nagyobb sebfelületek esetén használata tilos. Esetleg szájon át történő alkalmazásánál szaponintartalma a gyomor nyálkahártyáját erősen izgatja. Nyersen elfogyasztott termései halálos mérgezést is okozhatnak.